

Batavia



La batavia (*Lactuca sativa* var. *capitata*) est une herbacée et un légume feuille de la famille des astéracées du genre *lactuca*.

La Batavia se consomme crue, cuite ou braisée.

La Batavia est une variété de Laitue cultivée

Caractéristiques de la batavia

Cycle : annuel

Hauteur : 25 cm de diamètre

Rusticité : selon les variétés

Besoin en eau : arrosage régulier et paillage pour protéger

Température de germination : supérieur à 7 °C, idéalement entre 12 et 15 °C

Ses amis : carottes, choux, betterave, concombre, pois, fraisier, radis, fèves, melons et oignons

Plantation de la batavia

Exposition : soleil et ombre légère

Type de sol : frais, profond, meuble, bien drainé et riche

Espacement des plans : 25 cm entre chaque plant

Espacement des lignes : 30 à 45 cm

Profondeur : semis 5 mm de profondeur

Rendement : 6 à 12 plants/m² en pleine terre

Maladies et ravageurs de la batavia

Ravageurs : les escargots et les limaces s'attaquent aux jeunes plants.

Calendriers de la batavia

Batavia

| | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semis sous châssis | J | F | M | A | M | | | A | S | | | |
| Semis en pépinière | | | | | | | | A | S | | | |
| Semis pleine terre | | | | | M | J | J | A | S | | | |
| Plantations | | | M | A | | | | | | O | N | D |
| Récoltes | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | |

les périodes de semis varient selon les variétés. Les semis sous abri pour la batavia de printemps se font de fin janvier jusqu'en avril-mai pour une récolte d'avril à juin, tandis que les semis en pleine terre pour la Batavia d'été et d'automne débutent en mai jusqu'en Aout, pour une récolte de juillet jusqu' à mi novembre. Repiquez en place ou un éclaircissez environ 4 à 5 semaines après le semis, lorsque les plantules ont 4-5 feuilles. Récoltez environ sept à dix semaines après le semis. Pour la Batavia d'hiver (variétés Batavia d'hiver St Antoine, mouchetée d'hiver) : Semis en place ou en godet de mi août à mi-septembre et mise en place octobre à décembre, pour une récolte 7 mois environ après le semis de janvier à mars.