

## Laurier rose blanc



Le laurier rose, appelé encore oléandre ou nérion (*Nerium oleander*) est un arbuste d'ornement de la famille des apocynacées du genre *nerium*.

Cet arbuste ornemental d'origine méditerranéenne est résistant assez à la sécheresse et à la taille. On l'utilise souvent pour former des haies. Sa forme buissonnante et son feuillage persistant font de lui un bon brise-vue. Sa floraison, selon les variétés, est odorante et de teintes variées ( blanc, rose, rouge, jaune, orange, ou bien encore saumon). Sa croissance est rapide.

Le Laurier rose est très toxique, l'ensemble de la plante contenant de l'oléandrine. L'eau dans laquelle ont macéré des feuilles, racines ou branches de laurier-rose est également toxique.

### Caractéristiques du laurier rose blanc

**Cycle** : vivace au feuillage persistant

**Hauteur** : 2 m de hauteur jusqu'à plus de 4 m de haut, Selon qu'il est taillé ou non.

**Rusticité** : de -4 à -12°C/-15 °C selon les variétés

**Besoin en eau** : arrosages réguliers l'été et paillage au pied pour garder un sol frais

**Rôle attractif** : Mellifère

### Plantation du laurier rose blanc

**Emplacement** : en pleine terre isolé ou dans une haie, en brise vue ou bien encore en pots.

**Exposition** : bien ensoleillée, à l'abri des vents dominants

**Type de sol** : bien drainé, terre ordinaire à riche.

**Espacement des plans** : 1 m à 1,5 m entre chaque plante

**Profondeur** : dans un trou environ 2,5 fois plus large que la motte.

### Maladies et ravageurs du laurier rose blanc

**Maladies :** Pseudomonas syringae est une bactérie qui se développe et se multiplie essentiellement à la surface des feuilles et particulièrement au printemps et à l'automne.

**Ravageurs :** Les pucerons, cochenilles et araignées rouges peuvent attaquer la plante.

## Calendriers du laurier rose blanc

### Laurier rose

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Plantations	J	F	M	A						O	N	D
Floraison					M	J	J	A	S	O		

La plantation se fait d'octobre à avril, hors période de gel. La floraison a lieu de la fin du printemps (mai-juin) à l'automne (septembre-octobre). Il se taille en mars avril. Sa multiplication est possible par marcottage ou par bouturage de ses tiges herbacées à partir du mois de juin et jusqu'au mois d'août (les rameaux sont préalablement trempés dans un récipient d'eau pour forcer l'apparition de racines, puis plantés dans du terreau).