

Néflier



Le néflier commun, mēlier (*Mespilus germanica*) est un arbre fruitier de la famille des rosacées du genre *mespilus*.

Le Néflier est un arbre fruitier et ornemental. Son fruit appelé nèfle est une fausse drupe. La nèfle se consomme blette, crue ou cuite en compote ou en confiture. Le bois du néflier est dense et se fend peu. Il est utilisé au Pays basque pour confectionner le makhila, un bâton de marche traditionnel.

Le Néflier est un arbre fruitier autofertile, au port étalé et buissonnant. Ses fruits apparaissent sur les rameaux de l'année précédente. Il ne faut pas le confondre avec le néflier du japon (*Eriobotrya japonica*).

Caractéristiques du néflier

Cycle : vivace au feuillage caduc

Hauteur : 5 à 6 m

Rusticité : jusqu'à - 20 °c

Besoin en eau : craint l'excès d'humidité.

Rôle attractif : Mellifère

Maladies et ravageurs du néflier

Maladies : Le néflier est sensible au feu bactérien. Maladies cryptogamiques : mildiou, monilia et oïdium.

Calendriers du néflier

Néflier

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Plantations	J	F	M	A							N	D
Floraison					M							
Récoltes										O		

Plantation : entre mi-novembre et fin avril, hors période de gel, idéalement en automne. Sa floraison de couleur blanche a lieu fin mai. La récolte des fruits intervient généralement fin

octobre, après les premières gelées. Mode de multiplication par semis (les semis sont très longs), drageonnage ou greffage.