

Radis rose



Le radis rose, petite rave (*Raphanus sativus*) est un légume racine de la famille des brassicacées (ex crucifères) du genre raphanus.

Vous pouvez consommer la racine et les feuilles (fanés).

Caractéristiques du radis rose

Cycle : annuelle ou bisannuelle

Hauteur : 20 cm

Rusticité : Fragile, gélif

Besoin en eau : régulier (maintenir la fraîcheur)

Température de germination : la température du sol mini 8°C, idéalement 12°C.

Ses amis : tomate, céleri, épinards, aneth, laitue, cerfeuil, cresson du jardin

Ses ennemis : Les associations à éviter : chou (même prédateur), courges, ciboulette, tournesol sarriette.

Plantation du radis rose

Exposition : ensoleillée

Type de sol : riche en humus, frais, léger

Espacement des plans : semis clair en lignes ou à la volée. Eclaircir quand les radis ont 2 feuilles et laisser 3cm entre les plants.

Espacement des lignes : 20 cm

Profondeur : sillons de 2 centimètres de profondeur

Rendement : 4 à 6 bottes par m².

Rotation : Semer après le radis : la scarole, les épinards, la laitue ou encore la tomate.

Cultures associée : bette, carottes, épinards, endives, laitues, pois, tomate, panais, haricot, cerfeuil, cresson alénois.

Maladies et ravageurs du radis rose

Maladies : fonte des semis (champignon)

Ravageurs : Altise (la salade, les épinards, l'aneth éloignent les altises), mouche du chou (l'odeur des tomates comme répulsif olfactif), limaces

Calendriers du radis rose

Radis (variétés hâtives et à forcer)

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Semis sur couche chaude	J	F										D
Semis sous châssis		F	M									
Récoltes	J	F	M	A	M							

Variétés à forcer : Semer sur couche en place de décembre à février, récolte un mois plus tard.
Variétés hâtives: semis en février-mars sous châssis froid en exposition chaude et abritée pour récolte en avril-mai.

Radis (culture en pleine terre)

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Plantations			M	A	M	J	J	A	S			
Récoltes				A	M	J	J	A	S	O	N	

Toutes variétés : semis en pleine terre dès mars pour récolte en avril mai. Semer de mars à septembre pour récolter jusqu'en octobre-novembre.