

Rose trémière



La rose trémière, (anciennement appelée althéa) ou alcéa, passerose, rose à bâton, rose papale, primerose. (*Alcea rosea*) est une plante herbacée de la famille des malvacées du genre *alcea*.

Ses fleurs et ses jeunes feuilles tendres sont comestibles. Riche en mucilages, la rose trémière possède des propriétés adoucissantes et émoullientes.

La rose trémière est peu exigeante, elle supporte la chaleur et la sécheresse en sol profond et se ressème très facilement.

Caractéristiques de la rose trémière

Cycle : vivace cultivée comme annuelle ou bisannuelle

Hauteur : jusqu'à 2 ou 3 mètres

Rusticité : -15°C

Besoin en eau : modéré, arrosage par temps sec

Température de germination : 20 à 25 °C

Rôle attractif : La rose trémière, très mellifère, attire les papillons et de nombreux insectes pollinisateurs.

Plantation de la rose trémière

Emplacement : en fond de massif ou contre un mur, pour un jardin anglais ou champêtres

Exposition : plein soleil et abrité du vent

Type de sol : pauvre, profond et bien drainé. Elle tolère les terrains calcaires.

Espacement des plans : 50 cm

Profondeur : en poquet de 2 à 3 graines à 5 mm de profondeur

Rotation : tous les 2 à 3 ans

Cultures associée : lavande

Maladies et ravageurs de la rose trémière

Maladies : oïdium, rouille

Ravageurs : limaces et escargots

Calendriers de la rose trémière

Rose trémière

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Semis en pépinière		F	M									
Semis pleine terre				A	M	J			S	O		
Floraison						J	J	A	S			

Semis en pépinière en février mars ou semis en place en avril-mai (après les gelées), et septembre-octobre sous climat doux. Floraison de juin à fin septembre